

無論您是剛開始您的療程，還是正在尋找其他方法來治療您難以控制的中度至重度濕疹，以下的清單適用於患者和照護者。這份指南可作為您與濕疹專科醫生展開討論的參考，以協助確定DUPIXENT是否適合您或您的親人。請選擇所有符合您情況的答案。

您是患者還是照護者？

☐ 患者 ☐ 照護者

您或您的親人的治療目標是什麼？

☐ 改善皮膚 ☐ 減輕搔癢

您或您的親人患有中度至重度濕疹多久了？

☐ 0-2 年 ☐ 2-5 年 ☐ 5-10 年 ☐ 10 年以上

您或您的親人曾經被開立過哪些處方或使用過哪些方法來治療濕疹？

☐ 局部類固醇 ☐ 光療法 ☐ 口服類固醇 ☐ 生物製劑 ☐ 非處方產品
☐ 其他 _____ ☐ 無

請描述您或您的親人的濕疹症狀：

皮疹嚴重程度

☐ 無 ☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 重度

搔癢程度

☐ 無 ☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 重度

這些症狀發生的頻率為何？

搔癢

☐ 從不 ☐ 很少 ☐ 偶爾 ☐ 經常

發炎、變色的皮膚

☐ 從不 ☐ 很少 ☐ 偶爾 ☐ 經常

局部皮膚增厚或硬化

☐ 從不 ☐ 很少 ☐ 偶爾 ☐ 經常

多久發作一次

☐ 幾個月一次 ☐ 每月一次 ☐ 每週一次 ☐ 每天一次

每次發作持續多久

☐ 1-5 天 ☐ 5-10 天 ☐ 10-15 天 ☐ 15 天以上

您或您的親人的濕疹症狀出現在哪個部位？

☐ 頸部 ☐ 臉部 ☐ 手部 ☐ 胸部 ☐ 肘部 ☐ 踝部
☐ 腹部 ☐ 腳部 ☐ 頭皮 ☐ 膝蓋前面 ☐ 膝蓋後面
☐ 其他 _____

描述濕疹對您或您的親人的生活所造成的任何額外影響。



現在您已經完成了，只需拍張照片，然後在下一次預約時與您的濕疹專科醫生分享。

適應症

DUPIXENT 是用於治療患有中度至重度濕疹（異位性皮膚炎或AD）的成人和6個月及以上兒童患者的處方藥，這些濕疹在使用皮膚（局部）處方治療後仍無法得到很好的控制，或不能使用局部治療。DUPIXENT 可以單獨使用或與局部皮質類固醇藥物一同使用。尚不清楚 DUPIXENT 對患有異位性皮膚炎的未滿6個月兒童是否安全有效。

重要安全資訊

假如您對dupilumab或DUPIXENT® 的任何成分過敏，請勿使用。

請參閱下一頁的重要安全資訊、隨附包括患者資訊的完整處方說明(英文或中文)。

重要安全資訊(續)

在使用 DUPIXENT 之前，請告訴您的醫療保健提供者有關您的所有醫療狀況，包括您是否：

- 有眼疾。
- 患有寄生蟲（蠕蟲）感染。
- 有計劃接種任何疫苗。在接受 DUPIXENT 療程之前或治療期間，請勿接種「活性疫苗」。
- 已懷孕或計劃懷孕。尚不清楚 DUPIXENT 是否會對您的胎兒造成傷害。
○為在懷孕期間使用 DUPIXENT 的婦女設立懷孕登記冊，收集有關您和胎兒的健康資訊。
- 正在餵哺母乳或計劃餵哺母乳。尚不清楚 DUPIXENT 是否會進入您的母乳。

請告知您的醫療保健提供者您服用的所有藥物，包括處方藥和非處方藥、維他命和草本藥物保健品。

特別是如果您正在口服、局部外用或使用吸入式皮質類固醇藥物，又或患有異位性皮膚炎和哮喘並使用哮喘藥物，**請告知您的醫療保健提供者**。未經您的醫療保健提供者許可，**請勿**更換或停止服用您其他的藥物，包括皮質類固醇藥物或其他哮喘藥物。這可能會導致這些藥物控制的其他症狀復發。

DUPIXENT 可能導致嚴重的副作用，包括：

- **過敏反應。**使用 DUPIXENT 可能會引起過敏反應，包括皮膚過敏，有時可能十分嚴重。如果您出現以下任何體徵或症狀，請立即停止使用 DUPIXENT 並告知您的醫療保健提供者，或立即尋求緊急協助：呼吸困難或喘鳴、面部、嘴唇、口腔、舌頭或喉嚨腫脹、昏厥、頭暈、感到頭重腳輕、脈搏加快、發燒、蕁麻疹、皮膚出疹，包括靶心狀皮疹或疼痛的皮下紅色或藍色腫塊、全身不適、痕癢、淋巴結腫大、噁心或嘔吐、關節痛或胃部痙攣。
- **眼部問題。**如果您有任何新出現或惡化的眼部問題，包括眼痛或視力有變化，例如視力模糊，請告知您的醫療保健提供者。如有需要，您的醫療保健提供者可能會轉介您到眼科醫生處進行眼科檢查。
- **銀屑病（牛皮癬）。**這種情況可能發生在使用 DUPIXENT 的異位性皮膚炎患者身上。請告知您的醫療保健提供者有關您皮膚任何新的症狀。您的醫療保健提供者可能會轉介您到皮膚科醫生處進行檢查。
- **關節疼痛。**有些使用 DUPIXENT 的患者由於關節症狀而難以行走或移動，在某些情況下需要住院治療。如果出現任何新的關節症狀或症狀惡化，請告知您的醫療保健提供者。如果您出現關節症狀，您的醫療保健提供者可能會停用 DUPIXENT。

濕疹患者最常見的副作用包括注射部位反應、眼部問題，包括眼睛和眼瞼發炎、泛紅、腫脹、痕癢、眼部感染、眼乾、視力模糊、口腔或嘴唇上出現唇瘡，以及特定白血球數量過高（嗜酸性粒細胞增多症）。

假如有任何困擾您或持續的副作用，請告知您的醫療保健提供者。以上並非 DUPIXENT 所有可能的副作用。請致電您的醫生，尋求有關副作用的醫療建議。我們鼓勵您向美國食品及藥物管理局（FDA）報告處方藥的負面副作用。瀏覽 www.fda.gov/medwatch，或致電1-800-FDA-1088。

請嚴格按照您的醫療保健提供者的處方使用 DUPIXENT。這是一種在皮膚下注射的藥物（皮下注射）。您的醫療保健提供者會決定您或您的照顧者是否可以進行 DUPIXENT 注射。在您或您的照顧者接受醫療保健提供者的培訓之前，**請勿**嘗試準備和注射 DUPIXENT。對於 12 歲及以上的兒童，建議由成人或在成人監督下使用 DUPIXENT。對於 6 個月至 12 歲以下的兒童，DUPIXENT 應該由照顧者給予使用。

請參閱附上的完整處方資訊，包括患者資訊。